

Aquest document té com a objectiu establir el procés que un client ha de seguir per a la recollida d'orina.

En cas de que la mostra d'orina estigui destinada a un cultiu és important no haver pres cap antibiòtic en els dos darrers dies abans de la recollida. Llevat que el vostre metge o el nostre personal us digui el contrari, la mostra preferible és la corresponent a la primera micció del matí.

1. Renti's les mans abans i després de la recollida.
2. Abans de recollir l'orina renti's els genitals i assequi'ls bé amb una tovallola seca i neta. Si ha de recollir l'orina d'un nadó, faci el mateix procés.
3. Els adults han de recollir l'orina dins un recipient estèril amb tap de rosca i els nadons en una bossa per a orina pediàtrica estèril.

3.1. Adults

- 3.1.1. Desenrosqui el tap del recipient evitant tocar l'interior de la tapa i del recipient.
- 3.1.2. Orini les primeres gotes a la tassa de vàter, després segueixi orinant dins el recipient.
- 3.1.3. Enrosqui el tap al recipient de manera que quedi ben ajustat i que no hi hagi perill de que s'obri.

3.2. Nadons

- 3.2.1. Tregui l'adhesiu de la bossa pediàtrica.
 - 3.2.2. Adhereixi la bossa al voltant dels genitals de forma que el penis (en el cas dels nens) o els llavis superiors (en el cas de les nenes) quedin dins d'aquesta.
 - 3.2.3. Si transcorreguts 30 minuts el nadó no ha orinat, canviï la bossa i repeteixi tot el procés per evitar la contaminació de la mostra.
 - 3.2.4. Un cop recollida l'orina dins la bossa tanqui-la.
4. Porti la mostra al laboratori com més aviat millor. En cas que hagi de retardar la tramesa, porti la mostra en menys de 2 h des de la seva recollida. Si ha de trigar més temps conservi la mostra entre 4-6 °C. En cap cas pot retardar el lliurament més de 24 h.

Llista de distribució

Personal tècnic

Director

Director Tècnic

Adjunt

Realitzat:

RT

Aprovat:

DP

IN13-PO01-FP01

1/1